

TOP 5 KINDERKANKERS EN SIMPTOME

SIMPTOME

Been- en gewrigspyne, moegheid,
bleekheid, swakheid, bloeding
koors, gewigsverlies

Hoofpyne, duiseligheid,
balansprobleme, visie, gehoor-
of spraakprobleme, gereelde braking

Verswakte vermoë om te loop,
veranderinge van die oë (oë wat uitpeul)
donker sirkels onder oë, ooglede wat
hang, pyn in verskeie dele van die
liggaam, diarree, hoë bloeddruk

Swelsel of knop in die maag,
koors, pyn, naarheid, swak eetlus

Vergrote limfkliere in die nek,
oksels of lies, gewigsverlies,
koors, sweet en swakheid

TIPE KANKER

Akute Limfoblastiese Leukemie (ALL)

- Mees algemene kinderkanker, 25% van alle gevalle
- Kom gewoonlik voor by kinders tussen die ouderdomme van 2 & 4
- Meer algemeen by seuns
- Begin in die beenmurg, versprei na die bloed en dan na die organe

Breingewasse

- Breingewasse en ander tumore van senuweestelsel vorm ±13.4% van gevalle
- Daar is baie verskillende soorte breingewasse en behandeling en die vooruitsigte van elkeen verskil
- Die meeste begin in die laer dele van die brein

Neuroblastoom

- Die oorsprong is van onvolgroeide senuweeselle in babas en jong kinders (jonger as 5 jaar)
- Begin dikwels in byniere
- Meer algemeen by seuns

Wilm se Tumor

- Word gewoonlik gevorm in een nier, soms in beide niere, maar dit kom selde voor
- Gewoonlik kom dit voor onder kinders tussen die ouderdomme van 3 en 4

Limfoom

- Begin in limfotiese selle in immuunstelsel
- Beïnvloed limfkliere, limfwefsel

Twee hoof tipes:

Hodgkin se Limfoom/Siekte

- Skaars in kinders jonger as 5 jaar oud
- Soortgelyk in kinders en volwassenes

Nie-Hodgkin Limfoom

- Meer algemeen in jonger kinders maar skaars by kinders jonger as 5 jaar
- Kinders is geneig om beter te reageer op behandeling as volwassenes

